УДК 521:629.78

Н.А. Репях, Е.Н. Остапенко

*Пермский государственный национальный
исследовательский университет*Россия, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15
8 (342) 2-396-309

К ВЫВОДУ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ПЛОСКОГО ЗАМКНУТОГО МНОГОЗВЕННИКА

В работах [2–6] рассматривается динамика свободного орбитального движения космических систем цепочечной структуры. В данной работе приведены предварительные положения необходимые для вывода уравнений движения плоского замкнутого многозвенника.

Ключевые слова: орбитальное движение, многозвенник, кинематические уравнения, замкнутая система точек, разомкнутая система точек.

Рассмотрим движение плоского замкнутого многозвенника $M_0M_1\dots M_s$ в системе координат Ox (рис. 1), состоящего из M_k ($k = \overline{1, s}$) материальных точек, соединенных последовательно стрижнями с длинами l_k ($k = \overline{1, s+1}$). Будем считать, что известно движение точки $M_0(x_0, y_0)$, которую назовем опорной точкой. Положение этой точки зададим полярными координатами (r, ν) , где r – расстояние точки M_0 от начала координат, ν – угол, отсчитываемый от полярной оси Ox . Если O – гравитационный центр, то угол ν называют истинной аномалией опорной точки.

Рассматриваемый многозвенник можно представить, как цепочку, состоящую из $s+1$ материальной точки, $(s+1)$ -я точка

которой замыкает цепочку, совпадая геометрически с начальной точкой M_0 . В частности, случай $s = 2$ соответствует жесткому треугольнику, образованному стержнями l_1, l_2 и l_3 .

Рис. 1

Очевидно, декартовы координаты опорной точки будут определяться формулами:

$$\begin{cases} x_0 = r \cos \nu, \\ y_0 = r \sin \nu. \end{cases} \quad (1)$$

Прежде чем выводить уравнения движения замкнутой системы рассмотрим схему построения кинематических уравнений для разомкнутой системы тех же точек $M_0, M_1, \dots, M_s$.

Полагая, что положение опорной точки M_0 задано равенствами (1), декартовы координаты последующих точек $M_1, \dots, M_s$ определяются через обобщенные координаты φ_k ($k = \overline{1, s}$):

$$\begin{cases} x_k = x_{k-1} + l_k \cos \varphi_k, \\ y_k = y_{k-1} + l_k \sin \varphi_k. \end{cases} \quad (2)$$

где φ_k – угол, определяющий ориентацию стержня l_k .

Равенства (1) и (2) показывают, что число степеней свободы стержневой системы, состоящей из s стержней и соединяющих последовательно $(s + 1)$ материальные точки, равно

$$n = s + 2. \quad (3)$$

Переход от разомкнутой системы к замкнутой можно выполнить двумя способами.

Первый основан на введении в механическую систему точек дополнительного замыкающего стержня l_{s+1} , который соединяет точки $M_s(x_s, y_s)$ и

$$M_0(x_0, y_0) \equiv M_{s+1}(x_{s+1}, y_{s+1}). \quad (4)$$

По второму способу, если не вводить в рассмотрение замыкающий стержень l_{s+1} , следует выполнить условие (4) при $l_k \neq 0$ ($k = \overline{1, s}$):

$$M_0(x_0, y_0) \equiv M_s(x_s, y_s) \quad (5)$$

Второй способ приводится к первому, если считать $l_{s+1} = 0$, поэтому будем рассматривать первый способ, как более общий.

Тогда по первому способу, на основании соотношений (2) координаты последней точки $M_s(x_s, y_s)$ будут

$$\begin{cases} x_s = x_{s-1} + l_s \cos \varphi_s, \\ y_s = y_{s-1} + l_s \sin \varphi_s. \end{cases} \quad (6)$$

Условие замыкания при $l_{s+1} \neq 0$ примет вид

$$(x_s - x_0)^2 + (y_s - y_0)^2 = l_{s+1}^2. \quad (7)$$

Преобразование условия (7) с учетом (6) дает:

$$(x_{s-1} - x_0) \cos \varphi_s + (y_{s-1} - y_0) \sin \varphi_s = \frac{l_{s+1}^2 - l_s^2 - \rho_{s-1}^2}{2l_s}, \quad (8)$$

где $\vec{\rho}_{s-1} = \{x_{s-1} - x_0; y_{s-1} - y_0\}$ – вектор, соединяющий точки M_0 и M_{s-1} .

Равенство (8) показывает, что угол φ_s не является обобщенной координатой рассматриваемой замкнутой системы точек $M_0, M_1, \dots, M_s$, поскольку в силу рекуррентных соотношений (6) φ_s зависит от предыдущих углов $\varphi_{s-1}, \varphi_{s-2}, \dots, \varphi_0$. Следовательно, число степеней свободы замкнутой системы меньше n для разомкнутой системы на единицу и равно $s + 1$.

Введем угол ψ между радиус-вектором $\vec{\rho}_{s-1}$ и осью Ox (рис. 2).

Рис. 2

Очевидно, что при $\rho_{s-1} \neq 0$ справедливы равенства

$$\begin{cases} \cos \psi = \frac{x_{s-1} - x_0}{\rho_{s-1}}, \\ \sin \psi = \frac{y_{s-1} - y_0}{\rho_{s-1}}. \end{cases} \quad (9)$$

После преобразования равенства (8) с учетом (9) можно получить явные выражения либо для $\cos \varphi_s$, либо для $\sin \varphi_s$:

$$\begin{cases} \cos \varphi_s = H \cdot \cos \psi \pm \sin \psi \sqrt{1 - H^2}, \\ \sin \varphi_s = H \cdot \sin \psi \mp \cos \psi \sqrt{1 - H^2}, \end{cases} \quad (10)$$

где $H = \frac{l_{s+1}^2 - l_s^2 - \rho_{s-1}^2}{2l_s \rho_{s-1}}$ безразмерный параметр, зависящий от времени.

Заметим, что условие разрешимости (8) относительно φ_s записывается в виде

$$-1 \leq H \leq 1. \quad (11)$$

Дифференцируя равенства (6) с учетом (10) можно получить выражения проекций скорости точки M_s через обобщенные координаты и скорости замкнутой системы точек $M_0, M_1, \dots, M_s$.

Отметим, что для замыкания системы точек цепочечной структуры необходимо выполнения условия [1]

$$\sum_{k=0}^s \beta_k = \pi(s-1), \quad (12)$$

где β_k – внутренний угол в многозвеннике соответствующий вершине M_k .

Таким образом, получены условия (6), (10)–(12), необходимые для составления уравнений движения плоского замкнутого многозвенника.

Библиографический список

1. *Бронштейн И.Н., Семендяев К.А.* Справочник по математике. М. 1962. 608 с.

2. *Вертипрахов И.А., Остапенко Е.Н., Репьях Н.А.* Динамика стержневой большой орбитальной космической системы цепочечной структуры // Вестник Пермского университета. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2012. Вып. 4(12). С. 42–47.

3. *Курская К.Н., Маланин В.В., Остапенко Е.Н., Репьях Н.А.* Динамика больших орбитальных космических систем (БОКС) // Проблемы механики и управления. Нелинейные динамические системы: межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 2012. Вып. 44. С. 42–48.

4. *Курская К.Н., Репьях Н.А.* О движении трехточечной стержневой системы // Проблемы механики и управления. Нелинейные динамические системы: межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 2006. Вып. 38. С. 8–13.

5. *Маланин В.В., Остапенко Е.Н., Репьях Н.А.* Влияние масс концевых точек на динамику пятимассовой большой орбитальной космической системы цепочечной структуры // Вестник Пермского университета. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2014. Вып. 4(27). С. 43–48.

6. *Маланин В.В., Остапенко Е.Н., Репьях Н.А.* Свободное движение пятиточечной стержневой большой орбитальной космической системы цепочечной структуры в транспортирующей системе координат // Вестник Пермского университета. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2013. Вып. 3(22). С. 59–62.